Mange dagsommerfugle i Danmark er forsvundet pga. intensivt landbrug og brug af gødning og pesticider på marker og i haver. Skovene er desuden blevet for tætte og mørke. På skovenge, som bliver slået eller græsset af store græsædere, vil der være planter med nektar til de voksne sommerfugle og fødeplanter til larverne. Græsæderne skaber lysninger og dermed varme og det elsker sommerfuglene. Du kan hjælpe sommerfuglene.

Vil du have flere sommerfugle i din have?

Det er nemt at lokke alle slags insekter til haven. Hvis man planter eller sår lavendel, merian, isop, lægeoksetunge, gederams, mælkebøtte, rødkløver, røllike, storkenæb eller hjortetrøst er man sikker på at få besøg. Man kan også få sommerfugle såsom Nældens takvinge og Dagpåfugleøje til at yngle i haven. Det kræver blot et par kvadratmeter med brændenælder (Stor nælde) til larverne. Sidegevinsten er, at hvor der er insekter, er der også fugle. Her er nogle forslag til, hvor du kan søge mere viden om dagsommerfugle: lepidoptera.dk, gribskov.dn.dk, sommerfugleatlas.dk og naturbasen.dk

Tak for hjælp til Lepidopterologisk Forening og Danmarks Naturfredningsforening/Gribskov.

Sommerfuglebusken *Buddleja* er flittigt besøgt. Busken findes i mange farver. På denne lilla art sidder en **Kejserkåbe** (han).

Imellem hul 12 og hul 13 på Gilleleje Golfklubs bane er der sået en blomstereng for at tiltrække sommerfugle og andre insekter.

Gi' et stykke af græsplænen til sommerfuglene.

Vælg et åbent stykke af haven med masser af lys.

- Fjern græsset og de øverste 10-20 cm af jordlaget.
- Løsn jorden og bland den med 50% sand.
- Frøene blandes med "sandjorden" og spredes.
- Riv lidt så frøene bliver dækket og vand jordstykket.

En blomsterfrøblanding til sommerfugle og andre insekter kan købes i mange butikker og via internettet.

Status på dagsommerfugle i Danmark.

Der er registreret 60 forskellige arter dagsommerfugle i Danmark i år. Ifølge sommerfugleatlas.dk er 52 af de observerede arter markant færre i 2020 end hvad der gennemsnitligt er observeret de seneste 4 år. De 37 af dagsommerfuglearterne er rødlistede. Det betyder, at de er truede eller særligt sårbare.

Foto, layout, idé og tekst: Janne Aarre © 2020
www.golfognatur.dk



Dagsommerfugle

GILLELEJE GOLFKLUB

Citronsommerfugl

Gonepteryx rhamni

Hannen citrongul, hunnen hvidgullig. *54-64 mm. Let kendelig vingeform hvor alle fire vinger er trukket ud i en lille spids. Skov og krat, men strejfer til blomsterrige steder efter nektar. Larven lever på tørst og vrietorn. Voksne ses fra marts -juni (overvintrede) og juli til september.

Grønåret kålsommerfugl

Pieris napi

Kålsommerfugle findes overalt, men mest i haver hvor der ikke sprøjtes. *37-48 mm. Vingeoversiderne er hvide med sort forvingespids. På undersiden ses de grønne årer, som har givet sommerfuglen sit navn. Flyver fra maj-september, dog flest i højsommeren.

Dagpåfugleøje

Inachis io

Stor rødbrun sommerfugl med blålige vingepletter. *52-65 mm. Nok den mest velkendte af alle arter i Danmark. Træffes overalt. Larven æder Stor nælde. Flyvetid fra overvintring marts-maj og igen fra juli-oktober. Her suger to individer nektar på en sommerfuglebusk.

Nældens takvinge

Aglais urticae

Orangerød sommerfugl med sorte pletter på oversiden af vingeforkanten. Kendes på den hvide kantplet ved forvingespidsen. *45-50 mm.Træffes overalt. Larvens foderplante er Stor nælde. Her på Sankthansurt. Flyver fra marts-maj (efter overvintring) og igen juni-okt. Danmarks Nationalsommerfugl.

Tidselsommerfugl

Cynthia cardui



Stor orangebrun sommerfugl, som trækker hertil fra Nordafrika. *50-60 mm. Kendes på den sorte forvingespids med hvide pletter. Træffes overalt, men svinger i antal. I 2019 kom store sværme fra Afrika. Larvens foderplante er især tidsler, her dog på en purløgsblomst. Ankommer maj-juni, og danske efterkommere bliver set til juli-september.

Nældesommerfugl

Araschnia levana

En lille sommerfugl med to generationer. *31-42 mm. Forårsgenerationen er i orange farver med mørke pletter på vingeoversiden og sommergenerationen (foto) er mørk med en hvid streg på bagvingeoversiden og hvide pletter på forvingeoversiden. Larven lever på Stor nælde. Den orange form flyver fra april-juni og den mørke form fra juli-august.

* Vingefang

10 danske dagsommerfugle

Admiral

Vanessa atalanta

Stor sortagtig sommerfugl med rødorange vingebånd. *50-69 mm. Træffes overalt. Larven lever på Stor nælde. Kommer flyvende hertil fra Sydeuropa i maj-juni og danske efterkommere flyver fra juli-oktober. Mange trækker mod syd i august-oktober. I milde vintre overvintrer nogle i Danmark.

Engrandøje

Aphantopus hyperanthus

Temmelig mørk sommerfugl med ensfarvede vingeundersider, der ofte har gulringede øjepletter. *38-47 mm. Vidt udbredt i Danmark på lokaliteter med højt græs. Larvens foderplante er diverse græsarter. Flyver fra midt i juni til slutningen af august.

Græsrandøje

Maniola jurtina

Mørk sommerfugl, som lettest kendes på den orangebrune forvingeunderside. *31-47 mm. Findes i det meste af Danmark på steder med højt græs. Larven lever på forskellige græsarter. Flyvetid fra først i juni til sidst i august.

Almindelig blåfugl

Polyommatus icarus

Lille sommerfugl med et vingefang på *24-32 mm. Vidt udbredt i Danmark og ses oftest på varme, tørre, åbne og blomsterrige lokaliteter. Favoritplanten (voksen og larve) er Kællingetand, men også andre ærteblomster er set. Her er den på Merian. Flyvetid fra maj-september i to generationer.